

«Здоровые зубы здоровью любы»

(Зубы на втором году жизни и позже)

К началу 2-го года жизни ребенок должен иметь 8 зубов, первые малые коренные зубы прорезываются к 1 году 3 месяцам, клыки — к 1 году 5 месяцам — 1 году 8 месяцам, вторые малые коренные зубы — к концу 2-го года жизни. Таким образом, к началу 3-го года заканчивается прорезывание 20 молочных зубов. Для вычисления количества молочных зубов ребенка в возрасте от 6 до 24 месяцев можно пользоваться следующей формулой: возраст ребенка (месяцев) — 4 = количество зубов. Например, если ребенку 16 месяцев, то он должен иметь 12 зубов - (16—4 = 12). Сроки прорезывания зубов могут характеризовать как биологический, так и паспортный возраст ребенка. Процесс и сроки прорезывания зубов зависят не только от унаследованных генетических параметров, значение имеют и другие факторы. Например: климатические условия, характер питания, качество питьевой воды и другое. В связи с этим в разных регионах сроки прорезывания постоянных зубов колеблются. У человека в течение жизни происходит смена 20 зубов один раз, а остальные 8-12 зубов не меняются, они изначально прорезаются постоянными (коренными). До трех лет у ребенка прорезываются все молочные зубы, которые к 5 годам начинают постепенно заменяться на постоянные.

**«Ты стала меньше улыбаться, —
Твердят мои подружки.
А мне б зубов скорей дождаться...
Устала быть старушкой»**


У взрослого человека в норме 28-32 постоянных зуба: на каждой челюсти располагается по 4 резца, 2 клыка, 4 премоляра и 4-6 моляров. Развитие третьего моляра («зуба мудрости») может не произойти вообще, что считается так же нормой. Возможна и другая ситуация: зуб «мудрости» закладывается в толще челюсти, но никогда не прорезывается из-за неправильного положения или недостатка места в челюсти. Такая ситуация встречается очень часто. Прорезывание зубов происходит в определенной последовательности, что обеспечивает формирование правильного прикуса. Невыпавшие вовремя молочные зубы мешают прорезыванию постоянных зубов. В результате у ребенка может сформироваться неправильный прикус, что потребует в дальнейшем лечения у врача-ортодонта. Общего мнения о нормальных сроках прорезывания постоянных зубов не существует, есть

примерная последовательность нормального прорезывания постоянных зубов:

Сроки и порядок выпадения молочных зубов		Сроки и порядок прорезывания постоянных зубов	
Центральный резец	4-5 лет	Центральный резец	7-8 лет
Боковой резец	6-8 лет	Боковой резец	8-9
Клык	10-12 лет	Клык	11-12
Премоляры	10-12 лет	Премоляры	10-12
1-й моляр	6-7 лет	1-й моляр	6-7
2-й моляр	12-13 лет	2-й моляр	12-15

Прорезывание


7-9
МЕСЯЦЕВ



Выпадение


6-7 лет

10-12
МЕСЯЦЕВ




7-8 лет

12-16
МЕСЯЦЕВ




9-11 лет

16-20
МЕСЯЦЕВ



10-12 лет

24-30
МЕСЯЦЕВ



10-12 лет