



Пневмококковая инфекция



Возбудитель



Streptococcus pneumoniae,
часто называемый
ПНЕВМОКОКК




Существует 84 вида
пневмококков

Чем опасно заболевание

ВОЗ считает пневмококковую инфекцию главной причиной заболеваемости и смертности среди детей во всем мире

Путь передачи инфекции воздушно-капельный

- Чихание.
- Кашель.
- Разговор.
- Предметы, загрязненные слюной (чашки, ложки, игрушки).



Группы риска

1. Дети до 2 лет
2. Дети и взрослые с иммунодефицитом.
3. Лица с возрастным иммунодефицитом – старше 65 лет.
4. Лица с табачной зависимостью.
5. Лица с алкогольной зависимостью.

Пневмококк вызывает

группу бактериальных заболеваний, таких как:

1. Менингит.
2. Септицемия (заражение крови).
3. Пневмония.
4. Острый бронхит.
5. Инфекции верхних дыхательных путей.
6. Отит.
7. Синусит.
8. Эндокардит.

Факторы риска заболевания

1. Переохлаждение.
2. Респираторные заболевания.
3. Стресс.
4. Переутомление.
5. Гиповитаминозы.

Профилактика специфическая

1. Вакцинация детей раннего возраста (до 2 лет).
2. Вакцинация взрослого населения из группы риска (особенно – старше 65 лет).



Профилактика неспецифическая

1. Изоляция больных.
2. Витаминотерапия.
3. Физическая активность.
4. Закаливание.

